

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично для Вас, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии таких же симптомов, что и у Вас.

Уролесан®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Уролесан®

Международное непатентованное или группировочное наименование: душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты сибирской хвои масло + хмеля обыкновенного соплодий экстракт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав:

1 мл содержит:

Действующие вещества: пихты сибирской хвои масло – 67,60 мг; мяты перечной листьев масло – 16,90 мг; моркови дикой семян экстракт жидкий (1:1) – 194,35 мг; хмеля обыкновенного соплодий экстракт жидкий (1:1) – 278,80 мг; душицы обыкновенной травы экстракт жидкий (1:1) – 192,95 мг; клещевины обыкновенной семян масло – 92,95 мг.

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат – 0,04 мг.

Описание: жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов.

Фармакокинетика

Препарат содержит сложный комплекс биологически активных компонентов, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В комплексной терапии острого цистита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу, желчекаменной болезни.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- диспепсические явления: тошнота, рвота, диарея;
- диаметр камней в почках более 3 мм;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности в данной возрастной популяции).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата Уролесан® во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных по эффективности и безопасности у данной группы пациентов).

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 8-10 капель на кусочке сахара 3 раза в день до еды.

Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней.

При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель.

Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

При отсутствии положительного эффекта от проводимой в течение 5-7 дней терапии препаратом или ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (покраснение лица, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).

Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, общая слабость.

Нарушения со стороны сосудов: повышение артериального давления, снижение артериального давления.

Желудочно-кишечные нарушения: диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея, боли в животе), изжога.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Возможно усиление дозозависимых нежелательных реакций (в том числе тошноты, рвоты, изжоги, диареи, болей в животе, головокружения).

Лечение

В случае передозировки препаратом Уролесан® следует немедленно обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Препарат содержит 60 % этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта составляет 0,47 г, в максимальной суточной дозе препарата – 1,42 г.

В случае появления головокружения и тошноты при приеме препарата рекомендуется

обильное теплое питье и покой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность, а при появлении нежелательных реакций со стороны нервной системы (в том числе головокружение) следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 25 мл во флаконы темного стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами с пластиковыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек-капельниц без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Арт-Фарм»

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 17-23, этаж 6

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел.: (8332) 22-01-26

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Арт-Фарм»

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 17-23, этаж 6

Тел.: 8-495-640-20-02; +7-967-054-36-98

E-mail: Vladislav.Gorbunov@art-pharm.ru